

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA**  
**N. 15 DEL 27 GIUGNO 2019**

**OLIVO**

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino  
ARPAV 27/06  
h 13.00

Vicenza e pedemontana	giovedì 27 pom/sera	venerdì 28 mattina	venerdì 28 pom/sera	sabato 29 mattina	sabato 29 pom/sera	domenica 30	lunedì 1
stato del cielo							
temperatura	max 35/37 °C		min 23/25 °C max 31/33 °C		min 20/22 °C max 29/31 °C		
precipitazioni	Assenti	Assenti	Locali anche a carattere di rovescio/temporale		Assenti	Assenti	Modeste piogge locali
probabilità precipitazioni	0%	0%	10%		0%	0%	10%
attendibilità previsione		Buona	Buona		Buona	Buona	Buona

**Andamento meteo:** Tempo governato da un robusto nucleo di alta pressione per quasi tutta la settimana. Il periodo di solleone anticipato, iniziato dodici giorni fa, è stato brevemente interrotto da una modesta perturbazione transitata nella giornata di sabato u.s. la quale ha rinfrescato l'aria e ha portato un po' di pioggia (20-25 mm in pedemontana, da 2 a 15 mm altrove). Le temperature, dopo il significativo abbassamento di sabato, sono risalite prontamente e tra ieri ed oggi hanno superato i 35° pressochè ovunque portando nuovamente i valori medi settimanali di massime e minime al di sopra dei riferimenti della norma di 2,5-3°C circa. Questa tendenza, iniziata ai primi di giugno, pare destinata a durare ancora per diversi giorni a venire.

**Stato fenologico e colturale:** Fase di primo ingrossamento delle drupe (7-9 mm di lunghezza) nelle aree di bassa collina e pianura dove la fioritura ha avuto corso nella prima settimana di giugno mentre è di allegagione nella medio-alta collina (normale posticipo di 7-10 giorni rispetto alla bassa).

**I primi accertamenti effettuati in modo diffuso sul territorio hanno permesso di rilevare che la stagionalità produttiva non si presenta molto promettente, purtroppo.** Ciò è imputabile sia alla generale ridotta/scarsa emissione di mignole (in pedemontana soprattutto) sia alla modesta allegagione complessiva che, verosimilmente, è stata negativamente condizionata dalle condizioni meteo assai caldo-asciutte del periodo. Le condizioni vegetative degli impianti invece sono abbastanza buone ovunque, sia in termini di sviluppo dei germogli che di tono di colore. Date le elevatissime evapotraspirazioni attuali è necessario irrigare gli impianti nuovi/giovani e anche quelli adulti, ove possibile, nonchè provvedere allo sfalcio dei cotici. Sono stati reperiti alcuni casi di appassimento/avvizzimento dei frutticini assai simili a quelli già riscontrati negli anni precedenti.

**Stato parassitario:** *Malattie fungine* – l'Occhio di Pavone è generalmente diffuso. La sua presenza, fortemente contenuta dalle condizioni meteo correnti, riguarda al momento solo le foglie dello scorso anno. *Insetti* – Tignola: nelle trappole è stato raggiunto il picco delle presenze di adulti che danno origine alla 2° generazione. In laboratorio sono state esaminate un centinaio di mignole prelevate in zona berico-lessina senza reperire alcun uovo. Cimice asiatica – presenze contenute ma diffuse presso tutti gli impianti visionati con netta prevalenza di neanidi dal 1° al 3° stadio giovanile.

**Indirizzi di difesa:** A scopo cautelativo è opportuno effettuare entro questa fine settimana un intervento insetticida per combattere contemporaneamente Tignola, Cimice asiatica ed altri insetti minori. Impiegare preferibilmente un prodotto a base di Acetamiprid (es. Epik sl) in combinata con un prodotto rameico contro i parassiti fungini. Per i BIO, anziché l'Acetamiprid ricorrere a Bacillus thuringiensis e Piretro + Rame.

SC

Prossimo bollettino Olivo: 5 luglio



Berici -bassa collina (SC)



Berici -alta collina (SC)



1° cascola fisiologica (SC)



Giovane di Cimice asiatica su frutto neoformato (SC)



Campionamento presenza uova di Tignola (SC)



Uovo di Tignola (Prays oleae) su peduncolo calicino (SC)