Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 22 DEL 9 AGOSTO 2019

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV 09/08 h 13.00

Vicenza e pedemontana	venerdì 9 pom/sera	sabato 10 mattina	sabato 10 pom/sera	domenica 11 mattina	domenica 11 pom/sera	lunedì 12	martedì 13
stato del cielo							
temperatura	max 30/32 °C	min 20/22 °C max 32/34 °C		min 20/22 °C max 31/33 °C			
precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Qualche rovescio o temporale verso sera
probabilità precipitazioni	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%
attendibilità previsione		Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Buona	Discreta

Andamento meteo: Tempo a tratti molto instabile durante questa settimana, più o meno come quella precedente. Venerdì u.s. e poi martedì e mercoledì sono transitati dei temporali che hanno interessato tutto il territorio con forti colpi di vento e piovaschi. In pedemontana come nei Lessini le quantità di pioggia caduta sono state ragguardevoli nel complesso (da 50 a 65 mm con una punta massima di 82 a Bassano) mentre nei Berici sono state molto più contenute (da 4 a 24 mm). Le medie settimanali della temperatura sono scese ancora rispetto al periodo precedente facendo registrare valori di 28,5-30,5°C per le massime e di17,5-19,5°C per le minime. Non sono stati segnalati eventi grandinigeni di rilievo nei comprensori olivicoli.

Stato fenologico e colturale: Seconda fase di ingrossamento delle drupe. Le condizioni vegetative e idrico-nutrizionali degli impianti sono generalmente più che buone in tutti i comprensori.

Stato parassitario: *Mosca* – catture di adulti in contenuta crescita sia in pedemontana (max 20 individui/trappola, min 2) che nei Berici-Lessini (max 41, min 5). **L'entità media della popolazione adulta, rilevata presso 8 aziende di campionamento storiche dalla seconda metà di luglio in qua, risulta la più alta delle ultime 4 stagioni ed è assai vicina a quella del 2014 (anno di forte infestazione).** Ciò è dovuto anche al fatto che, diversamente dal passato, in 6 delle 8 aziende suddette non è stato fatto l'intervento insetticida consigliato (così come su molte altre) per via della scarsa promessa di remunerativià stagionale.

I campioni esaminati in laboratorio questa settimana (120 drupe da 8 aziende trattate e non) rivelano un'alta presenza di punture fertili. Nelle aziende che hanno trattato con larvicidi l'incidenza è compresa tra il 12 e il 22%, in quelle non trattate in alcun modo tra il 38 e il 55%! Nelle prime c'è un'elevata mortalità di uova e larve (80% circa) nelle seconde invece no (5% circa).

Indirizzi di difesa: Coloro che hanno effettuato il trattamento antidacico con prodotti larvicidi a base di Dimetoato o Acetamiprid possono stare relativamente tranquilli. **Chi segue il criterio di difesa biologico e/o impiega prodotti adulticidi come le esche avvelenate o le polveri di roccia o le argille, deve ripristinare la protezione alla scadenza di efficacia del prodotto o dopo una pioggia di pochi millimetri. A tutti gli olivicoltori si raccomanda l'esecuzione del trattamento rameico già indicato la scorsa settimana e si ricorda che è necessario reintervenire rapidamente (entro 48 ore) all'evenienza di una grandinata, anche leggera, per contenere la proliferazione del batterio della rogna e diversi altri nuovi patogeni agenti di cancro e deperimento del legno.**

SC

Attenzione: Il prossimo bollettino Olivo verrà emesso il 23 agosto

cv Grignan –bassa collina *(SC)*

cv Frantoio -media collina *(SC)*

Danni della grandinata di mercoledì 31/7 a Nanto *(SC)*

Adulti di cimice asiatica in accoppiamento (*SC)*

Numerose punture di mosca su drupe ben sviluppate *(SC)*

Larva di mosca all'interno di una drupa *(SC)*