Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 18 DEL 18 LUGLIO 2019

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV 18/07 h 16.00

Vicenza e pedemontana	giovedì 18 pom/sera	venerdì 19 mattina	venerdì 19 pom/sera	sabato 20 mattina	sabato 20 pom/sera	domenica 21	lunedì 22
stato del cielo							
temperatura	max 26/28 °C	min 16/18 °C max 28/30 °C		min 17/19 °C max 30/32 °C			
precipitazioni	Qualche rovescio o temporale	Assenti	Generalmente assenti	Locali anche a carattere di rovescio/temporale	Generalmente assenti	Assenti	Assenti
probabilità precipitazioni	70%	0%	10%	10%	10%	0%	0%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Discreta	Discreta	Buona	Buona

Andamento meteo: Tempo abbastanza fresco e relativamente instabile in quest'ultima settimana. La depressione che ha interessato tutto il territorio nel weekend u.s. ha determinato dei temporali che hanno scaricato da 22 a 56 mm di pioggia in pedemontana e da 5 a 15 mm nei Berici/Lessini e qualche spruzzata di grandine senza conseguenze di rilievo. La media settimanale delle temperature è stata di circa 27-28°C per le massime e di 16-17,5°C per le minime, valori entrambi inferiori alla norma del periodo di 1-1,5°C circa.

Stato fenologico e colturale: E iniziata la fase dell'indurimento del nocciolo in tutti i comprensori e su quasi tutte le varietà. L'espressione vegetativa degli impianti è generalmente tonica e attiva in pedemontana e nei Lessini così come nella parte centro settentrionale dei Berici mentre nella zona più meridionale, in vari settori non interessati dalle piogge, si notano le prime manifestazioni di stress idrico. **Prosegue, dove più dove meno ma pressochè ovunque, lo stillicidio dei fenomeni di disseccamento/necrosi/cascola delle drupe in accrescimento** che acuiscono ancor di più la già deludente prospettiva stagionale. Ai produttori (comprensibilmente delusi) che sono tentati di non occuparsi oltre della coltura per il resto dell'annata si ricorda che un comportamento siffatto avrebbe solo conseguenze negative sia sotto il profilo fitosanitario che agronomico e porterebbe inevitabilmente ad un peggioramento delle potenzialità produttive future!

Stato parassitario: *Mosca* – netto incremento della presenza di adulti nei Berici, soprattutto dove non è stato eseguito l'intervento insetticida di fine giugno contro la tignola e la cimice asiatica, con catture medie di 50 individui per trappola (picco massimo di 65). Nei Lessini invece il dato medio settimanale è di 25 insetti e in pedemontana di 14 (con un picco di 28). **Sulle drupe sono state rilevate poche punture da ovodeposizione e nessuna fertile.** *Cimice asiatica* – presenze di forme giovanili in aumento più che altro nell'areale berico-lessino.

Indirizzi di difesa: Data la penuria di prodotto pendente, è molto probabile che quest'anno si verifichi una "caccia alla drupa" da parte delle numerose femmine di mosca**. Dunque, per il momento solo nel comprensorio Berico-Lessino e laddove ne vale la pena, è necessario intervenire cautelativamente contro di esse.** Si può ricorrere all'impiego di esche avvelenate con Spinosad (max 8 int/anno) o Dimetoato (max 1 int/anno) o Deltametrina (max 3 int/anno) oppure intervenire in modo tradizionale con Dimetoato (max 2 int/anno) o Acetamiprid (max 1 int/anno). **Il trattamento va fatto entro i prossimi 4-5 giorni.**

SC

cv Leccino -media collina *(SC)*

cv Frantoio -bassa collina *(SC)*

Disseccamento e necrosi iniziale *(SC)*

Necrosi in stadio avanzato *(SC)*


Giovane di Cimice asiatica in alimentazione su drupa *(SC)*

Catture settimanali medio-alte nei Berici *(SC)*

Prossimo bollettino Olivo: 26 luglio